TRUSTEES FOR HARVARD UNIVERSITY
VE RI TAS
1941
EX LIBRIS
DUMBARTON OAKS
LIBRARY
09/10.022

100 w/cs

Plantes des Environs de Paris.

Plantes des Environs de Paris.

Ranunculaceæ.

Renonculacées.

Polyandrie.

Polygynie.

Adonis annua.

Adonis annuel.

Se trouve dans les champs, dans les moissons. Mai. Juin.

Chatillon... Bagneux... Pantin.

Famille naturelle.

Ranunculaceæ.

Renonculacées.

Système sexuel.

Polyandrie.

Polygynie.

Adonis annua.

Adonis annuel. ☉.

Saxifrageæ. Octandrie.

Saxifragées. Tétragynie.

Adoxa Moschatellina. L.

Adoxa Moscatelle. ♃.

Se trouve dans les bois couverts, dans les buissons. Avril.

Meudon.

Famille naturelle.

Saxifrageæ.

Saxifragées.

Système sexuel.

Octandrie

Tétragynie.

Adoxa moschatellina. L.

Adoxa moschatelle. ♃.

Fungi. Cryptogamie.

Champignons.

Agaricus Amethysteus. Bull.

Agaric Amethyste.

Croît dans les bois, en automne, parmi les feuilles mortes.

Romainville ... Meudon.

Fungi.

Cryptogamie.

Champignons.

Agaricus bulbosus. Bull.

Agaric bulbeux.

Bois sablonneux. Septembre. Dangereux; vulg. Oronge Ciguë.

Commun à Romainville.

[illegible]

Caryophylleæ. | Décandrie.

Caryophyllées. | Pentagynie.

Agrostemma Githago. L.

Agrostème des Moissons. ☉.

Commune dans les moissons. Été.

Alismaceæ. Hexandrie.

Alismacées. Polygynie.

Alisma ranunculoïdes. L.

Alisma Renoncule. ♃.

Croît au bord des Etangs, dans les endroits marécageux. Juillet. Août.

Saint Gratien ... Etang de Moret près Fontainebleau.

Liliaceæ. Hexandrie.

Liliacées. Monogynie.

Allium carinatum. L.

ail en carène. ♃.

Bois sablonneux. Juin. Juillet.

Commun au bois de Boulogne.

Ranunculaceæ.   Polyandrie

Renonculacées.   Polygynie.

Anemone nemorosa. L.

Anémone des bois. ♃.

Commune dans les bois. Avril.

Meudon. Bois de Boulogne. – Plessis-piquet. – Bondy. – Fontainebleau. &c.

Famille naturelle.

Renonculacées.

Anémonées.

Système sexuel.

Polyandrie.

Polygynie.

Anemone nemorosa. L.

Anémone des bois. ♃.

Ranunculaceæ.

Renonculacées.

Polyandrie.

Polygynie.

Anemone Pulsatilla. L.

Anémone Pulsatille. ♃.

Croît dans les endroits découverts des bois. Avril. mai.

Saint Maur.. Fontainebleau.

Famille naturelle

Renonculacées

Ranunculaceae.

Système sexuel.

Polyandrie.

Polygynie.

Anémone Pulsatille.

Anemone Pulsatilla. ♃

Caryophylleæ.

Caryophyllées.

Decandrie.

Trigynie.

Arenaria serpyllifolia L.

arenaria à feuilles de serpolet. ⊙.

Commune dans les lieux arides, sur les murs, au bord des chemins. Été.

Apocyneæ. Pentandrie.

Apocynées. Digynie.

Asclepias Vincetoxicum. L.

Asclepias Dompte-venin. ♃.

Croît dans les endroits secs des bois, sur les côtes pierreuses. Mai. Juin.

Bois de Boulogne. – Vincennes (coteau de beauté). Fontainebleau.

Famille naturelle.

Apocyneæ.

Apocynées.

Système sexuel.

Pentandrie.

Digynie.

Asclepias vincetoxicum. L.

Asclepias dompte venin. ♃.

Fungi.

Champignons.

Cryptogamie.

Boletus versicolor. L.

Bolet bigarré.

Commun dans les bois, sur les vieilles souches.

Campanulaceæ. Pentandrie.

Campanulacées. Monogynie.

Campanula rotundifolia. L.

Campanule à feuilles rondes. ♃.

Très commune, dans les buissons, au bord des allées des bois. Été.

Famille naturelle.

Campanulaceæ.

Campanulacées.

Système sexuel.

Pentandrie.

Monogynie.

Campanula rotundifolia. L.

Campanule à feuilles rondes. ♃.

Cruciferæ.

Crucifères.

Tétradynamie

Siliqueuse.

Cardamine pratensis. L.

Cardamine des prés. . ♃.

Se trouve dans les prés humides. avril. mai.

Meudon. - Sèvres. - Gentilly. &c.

Famille naturelle.

Cruciferæ.

Crucifères.

Système sexuel.

Tétradynamie

Siliqueuse.

Cardamine pratensis. L.

Cardamine des prés. ♃.

Cyperoideæ. | Monoécie.
Cypéroïdées. | Triandrie.

Carex præcox. Jacq.

Carex précoce. ♃.

Croît dans les endroits secs des bois. Mars. avril.

Bois de boulogne. Fontainebleau.

Flosculosæ.

Syngénésie.

Flosculeuses.

Polygamie frustranée.

Centaurea Cyanus. L.

Centaurée Bleuet. ☉.

Très frequents dans les moissons.

Famille naturelle.

Flosculosae.

Flosculeuses.

Système sexuel.

Syngenesie.

Polygamie frustranée.

Centaurea Cyanus. L.

Centaurée Bluet. ☉.

Gentianeæ. Octandrie.

Gentianées. Monogynie.

Chlora perfoliata. L. m.

Chlora perfolié. ⊙.

Croît dans les prés humides; dans les bois, aux endroits inondés pendant l'hiver. Juillet. Aout.

Fleury.. St Gratien.. Valvins près Fontainebleau.

Famille naturelle.
Gentianeæ.
Gentianées.

Système sexuel.
Octandrie.
Monogynie.

Chlora perfoliata.
Chlora perfolié. ⊙.

Radiatæ.

Radiées.

Syngénésie.

polygamie superflue.

Chrysanthemum leucanthemum. L.

Chrysanthème grande-Marguerite. ♃.

Commune dans les prés. Été.

Onagree.

Onagres

Diandrie

Monogynie.

Circæa lutetiana. L.

Circée des bois. ♃.

Se trouve dans les bois ombragés. Juin. Juillet.

St. Cloud.. Meudon.. Fourqueux.

Flosculosæ.

Flosculeuses.

Syngénésie

polygamie égale.

Cnicus eriophorus.

Cnicus à tête laineuse. ♂.

Croît le long des chemins. Juillet août. Carduus eriophorus L.

Bois de Malmaison, devant la bergerie.

Famille naturelle.

Flosculosæ.

Flosculeuses.

System sexuel.

Syngénésie.

Polygamie égale.

Cnicus eriophorus, willd: sp.

Cnicus à tête laineuse. ♂.

Caryophylleæ.

Décandrie.

Caryophyllées.

Digynie.

Dianthus armeria. L.

Oeillet velu. ☉

Bois sablonneux. Juin. Juillet.

Meudon. Fleury.

Caryophylleæ.

Caryophyllées.

Décandrie.

Digynie.

Dianthus Carthusianorum. L.

œillet des Chartreux. ♃.

Commun dans les bois sablonneux. Juin. Juillet.

Bois de boulogne. – Fontainebleau.

Famille naturelle.

Caryophylleæ.

Caryophyllées.

Système sexuel.

Decandrie.

Digynie.

Dianthus Carthusianorum L.

Oeillet des Chartreux. ♃.

Caryophylleæ.

Caryophyllées.

Décandrie

Digynie.

Dianthus prolifer. L.

Oeillet prolifère. ⊙.

Commun dans les lieux arides. Eté.

Plaine du point du jour. - Gentilly. - issy.

Scrophylariæ.

Scrophulaires.

Didynamie

angiospermie.

Digitalis lutea. L.

Digitale jaune. ♃.

Croît dans les bois montueux. Juin. Juillet.

Valvins près Fontainebleau.

Cruciferæ.

Crucifères.

Tetradynamie.

Siliculeuse.

Draba verna. L.

Draba printanier. ⊙.

Commun dans les endroits sablonneux. Mars. avril.

Bois de Boulogne. – Vincennes. – Fleury – Fontainebleau.

Famille naturelle.

Cruciferæ.

Crucifères.

Système sexuel.

Tétradynamie

Siliculeuse.

Draba verna. L.

Draba printanier. ☉.

Musci. Cryptogamie.

Mousses.

Encalypta vulgaris. Hedw.
Eteignoir commun.

Croît dans les endroits secs, sur les murs. avril. Bryum extinctorium. L.
Fontainebleau.

Ericaceæ.

Ericacées

Octandrie.

Monogynie.

Erica Tetralix. L.

Bruyère Tétralix. ♄.

Bois marécageux.. Été.

Montmorency.

Radiatae. Syngénésie.

Radiées. polygamie superflue.

Erigeron acre. L.

Erigéron acre. ☉.

Croit dans les lieux arides. Été.

Plaine du point du jour. — Bois de Boulogne — Poissy. — Fontainebleau.

Geranieæ.

Géraniées.

Monadelphie.

Pentandrie.

Erodium cicutarium. willd.

Erodium Cicutaire. ♃.

Commun dans les gazons, sur le bord des champs. Juin. (Geranium cicutarium L.)

Famille naturelle.

Gerania.

Geranium.

Système sexuel.

Monadelphie.

Pentandrie.

Erodium cicutarium. villd.

Erodium cicutaire. ♃.

Cruciferæ.

Crucifères.

Tetradynamie.

Siliqueuse.

Erysimum cheiranthoides. L.

Erysimum Giroflée. ☉.

Se trouve dans les lieux cultivés. Juillet. aout.

Charenton. - Romainville.

Rosaceæ. Icosandrie.

Rosacées. Polygynie.

Fragaria vesca. L.

Fraisier des bois. ♃.

Commun dans les bois montueux, découverts. Avril. Mai.

Famille naturelle.

Rosaceæ.

Rosacées.

Système sexuel.

Icosandrie.

Polygynie.

Fragaria vesca. L.

Fraisier des bois. ♃

Geranieæ.

Géraniées.

Monadelphie.

Décandrie.

Geranium columbinum. L.

Géranium colombin. ☉.

Commun dans les prés, dans les buissons. Été.

Famille naturelle.

Geraniu.

Geranium.

Système sexuel.

Monadelphie.

Décandrie.

Geranium columbinum. L.

Geranium colombin. ⊙.

Geranieæ.

Géraniées.

Monadelphie.

Décandrie.

Geranium sanguineum. L.

Géranium sanguin. ♃.

Se trouve dans les bois sablonneux. Juin. Juillet.

Bois de Boulogne. – Fontainebleau.

Famille naturelle.

Gerania.

Geranium.

Système sexuel.

Monadelphie.

Décandrie.

Geranium sanguineum. L.

Geranium sanguin. ♃.

Cisti.

Cistes.

Polyandrie.

Monogynie.

Helianthemum appenninum. Dec.

Hélianthème des appennins. ♄.

Croît sur les collines pierreuses. Été. (Cistus appenninus L.)

Fontainebleau.

Cisti.

Cistes.

Polyandrie.

Monogynie.

Helianthemum guttatum. Mill.

Helianthème taché. ☉.

Bois sablonneux. Été. (cistus guttatus. L.)

Bois de Boulogne.- Fontainebleau.

Famille naturelle.
Cisti.
Cistes.

Système sexuel.
Polyandrie.
Monogynie.

Helianthemum guttatum. L.

Helianthème maculé. ⊙.

Liliaceæ.

Liliacées.

Hexandrie.

Monogynie.

Hyacinthus non-scriptus. L.

Jacinthe des bois. ♃.

Très commune dans les bois. avril. mai.

Famille naturelle.
Asphodèles.
Liliacées.

Système sexuel.
Hexandrie.
Monogynie.

Hyacinthus non-scriptus. L.   *Jacinthe des bois. ♃.*

Solaneæ. | Pentandrie.
Solanées. | Monogynie.

Hyosciamus niger. L.
Jusquiame noire. ♂

Se trouve sur les bords des chemins, dans les lieux incultes. Juin. Juillet. aout. Vénéneuse.

famille naturelle.

Solaneæ.

Solanées

Système sexuel.

Pentandrie.

Monogynie.

Hyosciamus niger. L.

Jusquiame noire. ⊙.

Cruciferæ. | Tetradynamie
Crucifères. | Siliculeuse.

Iberis nudicaulis. L.

Ibéris à tige nue. ⊙

Croît dans les endroits sablonneux. Mai.

Bois de Boulogne - Plessis-piquet. -

Radiatæ. Syngénésie.

Radiées. Polygamie superflue.

Inula britannica. L.

Aunée britannique. ♃.

Croît aux bords de la Seine et de la Marne. Juillet. août.

Sèvres. – Charenton. –

Irideæ.

Iridées.

Triandrie.

Monogynie.

Iris pseudo-Acorus. L.

Iris des marais. ♃.

Commun dans les marais, dans les ruisseaux fangeux. Mai.

Etang de St Gratien. – Canal de l'Ourcq. – prairie de Gentilly ? –

Labiatæ.

Labiées.

Didynamie.

gymnospermie.

Lamium album. L.

Lamium blanc. ♃.

Très commun le long des chemins et des murs. printemps. Été. automne.

Famille naturelle.
Labiatæ.
Labiées.

Système sexuel.
Didynamie.
Gymnospermie.

Lamium album. L.

Lamium blanc. ♃.

Labiatæ.

Labiées.

Didynamie.

Gymnospermie.

Lamium purpureum. L.

Lamium pourpre. ⊙.

Se trouve communément dans les endroits cultivés _ Printemps.

Leguminosæ.

Diadelphie.

Légumineuses.

Décandrie.

Lathyrus palustris. L.

Gesse des marais. ♃.

Se trouve dans les prés marécageux. Juin. Juillet.

Saint Gratien. - Cachan.

Famille naturelle.

Légumineuse.

Légumineuses.

Système sexuel.

Diadelphie.

Décandrie.

Lathyrus palustris. L.

Gesse des marais. ♃.

Jasmineae. Diandrie.

Jasminées. Monogynie.

Ligustrum vulgare. L.

Troëne commun. ♄.

Se trouve dans les bois. Mai. Juin.

Fleury.- Meudon.

Famille naturelle.
Jasmineæ.
Jasminées.

Système sexuel.
Diandrie.
Monogynie.

Ligustrum vulgare. L.

Troëne commun. ♄.

Caryophylleæ. | Pentandrie.
Caryophyllées. | Pentagynie.

Linum catharticum. L.

Lin cathartique. ⊙.

Croît dans les allées ombragées des bois. Été.

Meudon. - Parc de St Cloud. - Bondy. - Fontainebleau.

Solaneæ.

Solanées.

Pentandrie.

Monogynie.

Lycium barbarum. L.

Lycium lancéolé. ♄.

Commun dans les haies, autour des Jardins. Été.

Famille naturelle.

Solaneæ.

Solanées.

Système sexuel.

Pentandrie.

Monogynie.

Lycium barbarum. L.

Lycium lancéolé. h.

Pediculares.

Pédiculaires.

Didynamie.

angiospermie.

Melampyrum cristatum. L.

Mélampyrum à crête. ⊙.

Se trouve dans les bois secs. Juillet.

Bois de boulogne.

Famille naturelle.

Pediculares.

Pediculaires.

Système sexuel.

Didynamie.

Angiospermie.

Melampyrum cristatum L.

Melampyrum à crête. ☉.

Liliaceæ. Hexandrie.

Liliacées. Monogynie.

Muscari racemosum. Willd.

Muscari à grappe. ♃.

Croît dans les endroits cultivés. avril-mai. (Hyacinthus racemosus L.)

plaine de grenelle.- Saint maur.-

Famille naturelle.

Liliaceæ.

Liliacées.

Système sexuel.

Hexandrie.

Monogynie.

Muscari racemosum.

Muscari à grappe. ♃.

Borragineæ.

Borraginées.

Pentandrie.

Monogynie.

Myosotis palustris.

Myosotis des marais. ♃.

Croît au bord des eaux et dans les prés humides. Été.

Famille naturelle.

Borragineæ.

Borraginées.

Système sexuel.

Pentandrie.

Monogynie.

Myosotis palustris.

Myosotis des marais. ♃.

Ranunculaceæ.

Renonculacées.

Hexandrie.

Polygynie.

Myosurus minimus. L.

Myosurus queue-de-souris. ⊙.

Se trouve dans les moissons. Mai. Juin.

Chailly près Fontainebleau.

Ranunculaceæ. | Polyandrie.

Renonculacées. | Pentagynie.

Nigella arvensis. L.

Nigelle des champs. ⊙.

Se trouve dans les champs, après la moisson. Aout. Septembre.

Nanterre. — Saint maur. — Plaine du point du Jour.

Famille naturelle.

Ranunculaceæ.

Renonculacées.

Système sexuel.

Polyandrie.

Pentagynie.

Nigella arvensis. L.

Nigelle des champs. ⊙.

Hydrocharideæ.

Hydrocharidées.

Polyandrie.

Monogynie.

Nymphæa lutea. L.

Nymphea jaune. ♃.

Vient dans les eaux tranquilles. Été.

Dans la Seine, à Charenton, Sèvres, Marly.

Famille naturelle.

Hydrocharideæ.

Hydrocharidées.

Système sexuel.

Polyandrie.

Monogynie.

Nymphæa lutea. L.

Nymphéa jaune. ♃.

Orchideæ.

Gynandrie.

Orchidées.

Diandrie.

Ophrys antropophora. L.

Ophrys Homme. ♃.

Se trouve dans les prés. Mai. Juin.

Parc de Fontainebleau, dans les gazons qui bordent le canal.

Orchideæ. Gynandrie.

Orchidées. Diandrie.

Ophrys apifera. Huds.

Ophrys abeille. ♃.

Croît dans les bois montueux, sur les collines. Mai. Juin.

Parc de St Cloud. - Sèvres - Valvins près Fontainebleau.

Famille naturelle.

Orchidées.

Ophrydées.

Système sexuel.

Gynandrie.

Diandrie.

Ophrys apifera.

Ophrys Bourdon.

Orchideæ. Gynandrie.

Orchidées. Diandrie.

Ophrys Arachnites. Willd.

Ophrys Araignée. ♃.

Se trouve au bord des bois. Mai.

Saint-Maur.

Famille naturelle.

Orchideæ.

Orchidées.

Système sexuel.

Gynandrie.

Diandrie.

Ophrys arachnites.

Ophrys araignée. W.

Orchideæ. Gynandrie.

Orchidées Diandrie.

Ophrys Myodes. Jacq.

Ophrys Mouche. ♃.

Croit dans les bois montueux, sur les collines. Mai. Juin.

Parc de Saint Cloud. -- Fontainebleau.

Famille naturelle.

Orchideæ.

Orchidées.

Système sexuel.

Gynandrie.

Diandrie.

Ophrys Myodes.

Ophrys Mouche.

Orchideæ. | Gynandrie.
Orchidées. | Diandrie.

Orchis bifolia. L.

Orchis à deux feuilles. ♃.

Commun dans les bois ombragés, un peu humides. Mai-Juin.

Parc de Saint Cloud. - Fleury. -

Famille naturelle.

Orchideæ.

Orchidées.

Système sexuel.

Gynandrie.

Diandrie.

Orchis bifolia. ♃

Orchis à deux feuilles. ♃

Orchideæ. Gynandrie.

Orchidées. Diandrie.

Orchis coriophora. L.

Orchis à odeur de punaise. ♃.

Prés humides. - Mai. Juin.

Plessis-piquet.

Famille naturelle.

Orchideæ.

Orchidées.

Système sexuel.

Gynandrie.

Diandrie.

Orchis coriophora. L. — *Orchis à odeur de punaise. ♃.*

Orchideæ. Gynandrie.

Orchidées. Diandrie.

Orchys latifolia. L.

Orchis à larges feuilles. ♃.

Commun dans les prés humides. Mai. Juin.

Saint gratien. – Plessis piquet. – Sèvres. – Villedavray.

Famille naturelle.

Orchideæ.

Orchidées.

Système sexuel.

Gynandrie.

Diandrie.

Orchis latifolia. L.

Orchis à larges feuilles. ♃.

Orchideæ.

Gynandrie.

Orchidées

Diandrie.

Orchis maculata. L.

Orchis taché. ♃.

Très commun dans les bois et dans les prés humides. Juin. Juillet.

Famille naturelle.

Orchideæ.

Orchidées.

Système sexuel.

Gynandrie.

Diandrie.

Orchis maculata. L.

Orchis maculé. ♃.

Orchideæ. Gynandrie.

Orchidées. Diandrie.

Orchis Morio. L.

Orchis Morio. ♃.

Se trouve dans les prés, au bord des bois. Mai. Juin.

Saintmans.

Orchideæ. Gynandrie.

Orchidées. Diandrie.

Orchis pyramidalis. L.

Orchis pyramidal. ♃.

Croît dans les gazons. Mai. Juin.

Parc de Fontainebleau. – Valvins près Fontainebleau.

Orchideæ. Gynandrie.

Orchidées. Diandrie.

Orchis simia.

Orchis singe. ♃.

Se trouve sur le bord des bois. Mai. Juin.

Saint-Maur.

Famille naturelle.

Orchideae.

Orchidées.

Système sexuel.

Gynandrie.

Diandrie.

Orchis Simia.

Orchis Singe. ♃.

Orchideæ. Gynandrie.

Orchidées. Diandrie.

Orchis ustulata. L.

Orchis charbonné. ♃.

Croît dans les prés. Mai. Juin.

Fontainebleau... Plessis piquet, dans les prés qui avoisinent l'étang.

Liliaceæ. Hexandrie.

Liliacées. Monogynie.

Ornithogalum minimum. L.

Ornithogale naine. ♃.

Se trouve dans les champs et dans les endroits cultivés. Avril.

Plaine de grenelle, entre Issy et la seine.

Famille naturelle.

Liliaceæ.

Liliacées.

Système sexuel.

Hexandrie.

Monogynie.

Ornithogalum minimum. L.

Ornithogale naine. ♃.

Liliaceæ.

Hexandrie.

Liliacées.

Monogynie.

Ornithogalum pyrenaicum. L.

Ornithogale des pyrénées. ♃.

croît dans les bois. Mai. Juin.

Montmorency... Valvins près Fontainebleau.

Liliaceæ.

Liliacées.

Hexandrie.

Monogynie.

Ornithogalum umbellatum. L.

Ornithogale en ombelle. ♃.

Se trouve dans les bois et dans les champs. Mai.

Saint cloud.. Sceaux... Gentilly.

Famille naturelle.

Liliaceæ.

Liliacées.

Systême sexuel.

Hexandrie.

Monogynie.

Ornithogalum umbellatum. L.

Ornithogale en ombelle. ♃.

Capparideæ. | Pentandrie.

Capparidées. | Tétragynie.

Parnassia palustris. L.

Parnassie des marais. ♃.

Prés marécageux. Septembre, octobre.

Glenny.

Famille naturelle.

Capparideæ.

Capparidées.

Systême sexuel.

Pentandrie.

Tetragynie.

Parnassia palustris. L.

Parnassia des marais. ♃.

Liliaceæ.

Liliacées.

Hexandrie.

Monogynie.

Phalangium Liliago.

Phalangium Liliago. ♃.

Se trouve dans les bois. Mai. Juin. (Anthericum Liliago. L.)

Fontainebleau.

Lysimachiæ. Diandrie

Lysimachies. Monogynie.

Pinguicula vulgaris. L.

Grassette commune. ♃.

Croît dans les terrains inondés. Mai. Juin.

Saint gratien.

Polygoneæ.

Octandrie.

Polygonées.

Trigynie.

Polygonum amphibium. L.

Polygone amphibie. ♃.

Commun dans les eaux tranquilles. Été.

Rosaceæ.

Icosandrie.

Rosacées.

Polygynie.

Potentilla Anserina. L.

Potentille Argentine. ♃.

Très commune sur les berges des rivières, sur les bords des chemins humides. Été.

Rosaceæ.

Rosacées.

Icosandrie.

Polygynie.

Potentilla splendens. Dec.

Potentille brillante. ♃.

Se trouve dans les bois sablonneux. Mai.

Bois de Boulogne.

Rosaceæ. Icosandrie.

Rosacées. Polygynie.

Potentilla verna. L.

Potentille printanière. ♃.

Commune dans les bois sablonneux, dans les endroits secs. Mars, avril.

B. de Boulogne... Vincennes... Plénispiquet... Fontainebleau.

Ranunculaceæ. Polyandrie.

Renonculacées. Polygynie.

Ranunculus acris. L.

Renoncule âcre. ♃.

Commune dans les prés. Été. vulg. Bouton d'or.

Famille naturelle.	*Système sexuel.*
Ranunculaceæ.	*Polyandrie.*
Renonculacées.	*Polygynie.*

Ranunculus acris. L. — *Renoncule âcre. ♃.*

Ranunculaceæ. | Polyandrie.
Renonculacées. | Polygynie.

Ranunculus arvensis. L.

Renoncule des champs. ☉.

Croît dans les moissons. Juin.

Bondy... Saint maur... Sceaux... Cachan.

Famille naturelle.

Ranunculaceæ.

Renonculacées.

Système sexuel.

Polyandrie.

Polygynie.

Ranunculus arvensis. L.

Renoncule des champs. ☉.

Ranunculaceæ. Polyandrie.

Renonculacées. Polygynie.

Ranunculus auricomus. L.

Renoncule à tête d'or. ♃.

Se trouve dans les bois couverts. Avril.

Plessy... Meudon... Vincennes.

Ranunculaceæ. | Polyandrie.
Renonculacées. | Polygynie.

Ranunculus bulbosus. L.

Renoncule bulbeuse. ♃.

Commune dans les prés, sur le bord des chemins. Été.

Famille naturelle.
Ranunculaceæ.
Renonculacées.

Système sexuel.
Polyandrie.
Polygynie.

Ranunculus bulbosus. L.

Renoncule bulbeuse. ♃.

Ranunculaceæ

Renonculacées.

Polyandrie.

Polygynie.

Ranunculus Flammula. L.

Renoncule petite Douve. ♃.

Commune dans les marais. Été.

Fleury... Meudon... S.t Gratien... Fontainebleau &c.

Ranunculaceæ. Polyandrie.

Renonculacées. Polygynie.

Ranunculus Lingua. L.

Renoncule lancéolée. ♃

Croît dans les marais. Été.

Bondy... S^t Gratien... Étang de Moret près Fontainebleau.

Ranunculaceæ.

Renonculacées.

Polyandrie.

Polygynie.

Ranunculus sceleratus. L.

Renoncule scélérate. ♃

Commune dans les marais. Été.

Lysimachiæ. Pentandrie.

Lysimachies. Monogynie.

Samolus valerandi. L.

Samolus Mouron d'eau. ☉.

Se trouve autour des mares. Eté.

Meudon... St. gratien... St. cucuphas.

Orchideæ.

Orchidées.

Gynandrie.

Diandrie.

Satyrium viride. L.

Satyrion vert. ♃.

Se trouve dans les prés humides. Mai. Juin.

Plessis-piquet ... St. Gratien.

Saxifrageæ.

Saxifragées.

Décandrie

Digynie.

Saxifraga granulata. L.

Saxifrage grenue. ♃.

Croît dans les bois secs. avril. mai.

Bois de Boulogne.

Famille naturelle.
Saxifrageæ.
Saxifragées.

Système sexuel.
Décandrie.
Digynie.

Saxifraga granulata. L.

Saxifrage grenue. ♃.

Saxifrageæ.

Saxifragées

Décandrie.

Digynie.

Saxifraga tridactylites. L.

Saxifrage à trois pointes. ⊙

Très commune dans les lieux arides, sur les toits, sur les vieux murs. Mars, avril.

famille naturelle.

Saxifrageæ.

Saxifragées.

Système sexuel.

Décandrie.

Digynie.

Saxifraga tridactylites. L.

Saxifrage à trois pointes. ⊙.

Liliaceæ.

Liliacées.

Hexandrie.

Monogynie.

Scilla autumnalis. L.

Scille d'automne. ♃.

Se trouve dans les bois secs. Aout. Septembre.

Bois de Boulogne... Fontainebleau.

Famille naturelle.
Liliacée.
Liliacées.

Système sexuel.
hexandrie.
Monogynie.

Scilla autumnalis. ♃.

Scille d'automne. ♃.

Sempervivæ.

Joubarbes.

Decandrie.

Pentagynie.

Sedum acre. L.

Sedum vermiculaire. ♃.

Très commun sur les vieux murs, sur les toits, dans les endroits secs. Mai. Juin.

Famille naturelle.

Sempervivæ.

Joubarbes.

Système sexuel.

Décandrie.

Pentagynie.

Sedum acre. L.

Sédum vermiculaire. ♃.

Orchideæ.

Orchidées.

Gynandrie.

Diandrie.

Serapias grandiflora. L.

Serapias à grande fleur. ♃.

Se trouve sur les coteaux des bois. Mai.

Parc de Saint-Cloud.

Famille naturelle.

Orchideæ.

Orchidées.

Systême sexuel.

Gynandrie.

Diandrie.

Serapias grandiflora. L.

Serapias à grandes fleurs. ♃.

Flosculosæ.

Flosculeuses.

Syngénésie.

Polygamie égale.

Serratula tinctoria. L.

Sarrette des Teinturiers. ♃.

Croit dans les bois. Aout. septembre.

Fontainebleau.

Solaneæ.

Solanées.

Pentandrie.

Monogynie.

Solanum nigrum. L.

Solanum à fruit noir. ⊙.

Commun le long des murs, dans les endroits cultivés. Été.

Famille naturelle.

Solaneæ.

Solanées.

Système sexuel.

Pentandrie.

Monogynie.

Solanum nigrum. L.

Solanum noir. ⊙.

Labiatæ.

Labiées.

Didynamie.

Gymnospermie.

Stachys arvensis. L.

Stachys des champs. ☉.

Croît dans les moissons et dans les endroits cultivés. Juin. Juillet.

Sceaux... Romainville.

Plumbagineæ. Pentandrie.

Plumbaginées. Pentagynie.

Statice plantaginea.

Staticé à feuilles de plantain. ♃

Croît dans les endroits secs et sablonneux. Juillet. Août.

Bois de Boulogne : Vincennes... St Maur... Plaine du point du Jour.

Cruciferæ. Tétradynamie.

Crucifères. Siliqueuse.

Sisymbrium Nasturtium. L.

Cresson de fontaine. ♃.

Commun dans les ruisseaux. Été.

Meudon... Gentilly. &c.

Rosaceæ.

Rosacées.

Icosandrie.

Polygynie.

Tormentilla erecta. L.

Tormentille droite. ♃.

Commune dans les bois. Juin. Juillet.

Rubiaceæ.

Rubiacées.

Tétrandrie.

Monogynie.

Valantia cruciata. L.

Valantia Croisette. ♃.

Commune dans les bois et les buissons. Mai. Juin.

Pédiculares.

Pédiculaires.

Diandrie.

Monogynie.

Veronica agrestis. L.

Véronique agreste. ⊙.

Très commune dans les champs cultivés. Printemps. Été.

Pédiculares.

Pédiculaires.

Diandrie.

Monogynie.

Veronica Anagallis. L.

Véronique Anagallis. ⊙.

Croît dans les eaux tranquilles. Été.

Gentilly ... Sceaux ... Fontainebleau.

Pedicularées.

Pédiculaires.

Diandrie.

Monogynie.

Veronica Chamædrys. L.

Véronique Chamædrys. ♃.

Fréquente dans les bois et dans les buissons. Mai. Juin.

Pediculares.

Pédiculaires.

Diandrie.

Monogynie.

Veronica hederæfolia. L.

Véronique à feuille de Lierre. ☉.

Commune dans les lieux cultivés. Avril. Mai.

Famille naturelle.

Pediculares.

Pédiculaires.

Système sexuel.

Diandrie.

Monogynie.

Veronica hederæfolia. L. — Veronique à feuilles de lierre. ⊙.

Cisti.

Cistes.

Pentandrie.

Monogynie.

Viola hirta. L.

Violette velue. ♃.

Commune dans les bois. Avril. Mai.

Famille naturelle.
Cisti.
Violes.

Système sexuel.
Pentandrie.
Monogynie.

Viola hirta. ♃

Violette velue. ♃

Adonis annua.
Adoxa Moschatellina.
Agaricus amethysteus.
Agaricus bulbosus.
Agrostema Githago.
Alisma ranunculoïdes.
Allium carinatum.
Anemone nemorosa.
Anemone pulsatilla.
Arenaria serpyllifolia.
Asclepias Vincetoxicum.
Boletus versicolor.
Campanula rotundifolia.
Cardamine pratensis.
Carex præcox.
Centaurea Cyanus.
Chlora perfoliata.
Chrysanthemum leucanthemum.
Circcea lutetiana.
Cnicus eriophorus.
Dianthus armeria.
Dianthus Carthusianorum.
Dianthus prolifer.
Digitalis lutea.
Draba verna.
Encalypta vulgaris.
Erica tetralix.
Erigeron acre.
Erodium cicutarium.
Erysimum cheiranthoides.
Fragaria vesca.
Geranium columbinum.
Geranium sanguineum.
Helianthemum appeninum.
Helianthemum guttatum.
Hyacinthus non-scriptus.
Hyosciamus niger.
Iberis nudicaulis.
Inula britannica.
Iris pseudo-Acorus.
Lamium album.
Lamium purpureum.
Lathyrus palustris.
Ligustrum vulgare.
Linum catharticum.
Lycium barbarum.
Melampyrum cristatum.
Muscari racemosum.
Myosotis palustris.
Myosurus minimus.
Nigella arvensis.
Nymphæa lutea.
Ophrys anthropophora.
Ophrys apifera.
Ophrys arachnites.
Ophrys Myodes.
Orchis bifolia.
Orchis coriophora.
Orchis latifolia.
Orchis maculata.
Orchis morio.
Orchis pyramidalis.
Orchis simia.
Orchis ustulata.
Ornithogalum minimum.
Ornithogalum pyrenaicum.
Ornithogalum umbellatum.
Parnassia palustris.
Phalangium Liliago.
Pinguicula vulgaris.
Polygonum amphibium.
Potentilla anserina.
Potentilla splendens.
Potentilla verna.
Ranunculus acris.
Ranunculus arvensis.
Ranunculus auricomus.
Ranunculus bulbosus.
Ranunculus flammula.
Ranunculus lingua.
Ranunculus sceleratus.
Samolus valerandi.
Satyrium viride.
Saxifraga granulata.
Saxifraga tridactylites.
Scilla autumnalis.
Sedum acre.
Serapias grandiflora.
Serratula tinctoria.
Solanum nigrum.
Stachys arvensis.
Statice plantaginea.
Sisymbrium nasturtium.
Tormentilla erecta.
Valantia cruciata.
Veronica agrestis.
Veronica Anagallis.
Veronica chamœdrys.
Veronica hederæfolia.
Viola hirta.

PLANTES
DES ENVIRONS
DE PARIS